CONTACT

CONTACTLINSEN
Monatstauschlinsen

DE EN ES FR IT BG CS DA EL ET FI FR HR
HU LV NL NO PL PT RO RU SL SR SV TR AR

STERILE

CE 0197

WÖHK CONTACTLINSEN GmbH
Bergermeister-Schade-Straße 12-16
D- 14513 Schönkirchen / Deutschland
Wöhk Contactlinsen GmbH
Bergermeister-Schade-Straße 12-16
D- 14513 Schönkirchen / Deutschland
Eine Marke von WÖHK CONTACTLINSEN

GEBRAUCHSANWEISUNG DE

ALLGEMEINE INFORMATION

Wöhk Contactlinsen sind zulässig für sehbedingte Fehlsichtigkeit, wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus durch und bewahren Sie sie auf. Contactlinsen sind Medizinprodukte und bedürfen einer qualifizierten Anpassung durch einen Augenarzt oder Augenoptiker.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ihre weichen Einsetzlinsen Contactlinsen sind Medizinprodukte und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie sind hergestellt aus dem Material Polymacon 38% (Vitalfocus & der Aerofilcon A.

ZWECKBESTIMMUNG/INDIKATION

Wiederverwendbare hydrogele Contactlinsen zur Korrektur der Fehlsichtigkeit des Auges, wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und zum Ausgleich von Hornhautverzerrungen (Astigmatismus). Sie können bis zu einem Monat ununterbrochen Tag und Nacht getragen werden. Kontaktlinsen sind ein Medizinprodukt zur Korrektur von Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit bis zu einem Augenblindwert von -6,50 dpt. In der torischen Dioptrienreihe dienen Ihre Contactlinsen zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus.

KONTRAINDIKATIONEN/ GEGENANZEIGEN

Ihre Produkt darf nicht verwendet werden bei gesunden Hornhaut, gesunden Lidern und gesunden Bindehäuten des Auges verwendet werden. Kontaktlinsen sind ungeeignet bei Kontaktlinsen und Infektionen des Auges, Entzündungen und Infektionen des Auges, Augenlidentzündungen, Bindehautentzündungen, Trockenheit des Auges, Allergien des Tränenfilms + Allgemeinerkrankungen, soweit diese sich negativ auf das Auge auswirken verbunden sind. + Lid- oder Hornhautdefekte, Hornhautdystrophie, Hornhautverletzung und Ulcera Corneae.

INHALT

Ihre weichen Contactlinsen lagern in einem sterilen phosphatgepufferten Kochsalz-Blister.

GEBRAUCH IHRER CONTACTLINSEN

Ihre Wöhk Contactlinsen sind hygienisch und sicher zu tragen. Beachten Sie folgende Hinweise: • Überschreiten Sie die empfohlene Tragedauer nicht. Sie kann bis zu 30 Tagen betragen. Die Tragedauer ist individuell mit abgestimmten Hüttberbestätiuten. • Wenn Sie Ihre Nutzungsdauer nicht einhalten dürfen eine neue Contactlinse erwirbt werden. Ihre Contactlinsen sind nicht mehr steril. Original Verpackung ist beschädigt. • Ihr Contactlinsenanpasser sagt Ihnen, wie lange Ihre Contactlinsen getragen werden sollen und welche Hygiene- und Pflegemittel möglich sind. • Haben Sie unterschiedliche Sehstärken, dann tauschen Sie Ihre Linsen nicht. • Die Lagerung und Pflegemittel sind nicht für Ihre Contactlinsen geeignet.

ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG DER CONTACTLINSEN

• Der Anwender wird durch den Anpasser in die Handhabung der Contactlinsen eingewiesen. • Ihre Hände müssen vor dem Anfassen nicht scharfkantig, um eine Verletzung des Auges zu vermeiden. • Entfernen Sie Ihre Ringe, Armbänder und Uhren. • Vermeiden von den Auf- und Abnehmen der Contactlinsen Ihrer Finger, Fingernägel, Ringe, Schmuck, Uhren, Kosmetika, Seife, Creme, Lotion, Puder, Parfüm, Haarspray, Insektenspray, Rasierwasser, Rasierschaum, Rasierseife, Rasierpinsel, Rasierklingen, Rasierapparat, Zahnpasta, Zahnbürste, Zahnseide, Zahnstocher, Kaugummi, Tabak, Alkohol, Getränke, Speisen, Kosmetika, Haarspray, Haarfärbemittel, Haarbürste, Kamm (nicht/ inkl) Ihres Aufwachen, Ihrer Kleidung, Ihrer Haustiere, Ihrer Umgebung, Ihrer Arbeitsplatz, Ihrer Arbeitsmittel, Ihrer Arbeitsmaschinen, Ihrer Arbeitsbeschreibung, Ihrer Arbeitsbeschreibung Ihrer Arbeitsbeschreibung Ihrer Arbeitsbeschreibung

se smanjiti uljepljenje i otoklinu ili drugu nelagodnost. Ako se pojave bilo koji od tih pokrajnih simptoma, prestanite s primjenom ovog lijeka i obratite se liječniku prije ponovnog korištenja ovog lijeka. Ovaj lijek sadrži benzil-alkohol. Ne smije se primjenjivati u slučaju novorođenčadi (do tjedan dana starosti). Može uzrokovati alergijske reakcije i lokalne iritacije. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem funkcije bubrega ili jetre. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem krvnog tlaka. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem srca. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem krvotoka. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem imunološkog sustava. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem metabolizma. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem probavnog sustava. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem živčanog sustava. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem mišićno-koštanog sustava. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem kože i potkožnog tkiva. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem bubrega i mokraćnih putova. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem reproduktivnog sustava i dojki. Ne smije se primjenjivati u slučaju bolesnika s poremećajem endokrinog sustava